



Prise en charge d'un patient MRSA lors de soins à domicile

7^{ème} Journée en hygiène pour les
soins chroniques


La Marive
5 février 2010




Définition

MRSA* = staphylocoque doré qui est résistant aux antibiotiques (β -lactames) qui sont habituellement prescrits pour traiter une infection à staphylocoque doré

*Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* = Staphylocoque doré résistant à la méticilline





Problèmes générés par le MRSA

- ☐ Augmentation morbidité et mortalité
 - **TTT toxiques**
 - **séjour prolongé**
 - **impact psychique**
 - ...
- ☐ Choix restreint des antibiotiques
- ☐ Augmentation charge de travail du personnel
 - **Soignants**
 - **Auxiliaires**
 - **Physios**
 -
- ☐ Coûts du traitement et sociaux importants
- ☐ Émergence de nouvelles résistances
- ☐ Importante circulation des patients dans le système sanitaire


Terminologie

👉 **Colonisation** = présence de microorganismes sans invasion (sans signe de maladie)

👉 **Contamination** (environnement, instruments) = présence de microorganismes

👉 **Infection** = invasion + signes cliniques et/ou effets biologiques (avec signes de maladie)

Proportion of MRSA isolates in participating countries in 2008
(c) EARSS



Nos objectifs

- ☐ **Prévention de la transmission du MRSA, par les mains d'un professionnel, d'un porteur de MRSA à d'autres patients soignés par le même professionnel**
- ☐ **Protection du professionnel**

Objectifs

- ☐ Prévenir MRSA, |
profess
d'autres
profess
- ☐ Protection



RSA à
même

Désinfection des mains



CHAQUE FOIS !

Avant c'est pour le patient
Après c'est pour moi et ...
le patient suivant

Port de gants



**C'EST HUMIDE →
JE METS DES GANTS**
Pour tout contact avec
des liquides biologiques
ou avec des muqueuses



Et je les ôte immédiatement après le soin +



Port de masque



ÇA GICLE, ÇA ÉCLABOUSSE ➡
JE PORTE UN MASQUE (ET
LUNETTES)

Si le patient tousse, crache
Si risque d'éclaboussures
Si je suis enrhumé ...



Après avoir enlevé le masque et les lunettes

Port d'une surblouse



**MA TENUE DE TRAVAIL
PEUT SE CONTAMINER →
JE LA PROTÈGE**

**Si risque d'éclaboussures,
de contamination de BMR**



Après avoir enlevé la surblouse

Retraitement du matériel



**J'UTILISE UNE
SEULE FOIS ... ➡**

**Je jette l'usage unique
Je retraite l'usage multiple**



UTILISER DE PRÉFÉRENCE DES DM À USAGE UNIQUE !

Le sac de soins



**JE NE LE POSE PAS
N'IMPORTE OÙ**

**Je le pose sur un linge
propre, une protection, ...**

En résumé...



**COMME AVEC TOUT
PATIENT**

J'applique strictement les
Précautions Standard


Littérature

- ☐ CDC : www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf
- ☐ Prise en charge de patients porteurs de MRSA en consultation ambulatoire; Unité HPCI Vaud, 2005
- ☐ **ABSTRACTS DE LA JOURNÉE NVKVV À OSTENDE** : Hygiène et prévention des infections en cas de soins à domicile; Lic. M. Vanneste, Lic. P. De Waegemaeker, Lic. J. De Schuijmer , Prof. Dr. G. Verschraegen; 17/03/2005
- ☐ Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de soins. Ministère de la Santé, 2006.
- ☐ www.hpci.ch
- ☐ Mesures de contrôles et prévention des infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline au Québec; Ministère de la Santé et des Services sociaux
- ☐ Courrier des lecteurs : Swiss-noso ; Volume 8, N° 2, Juin 2001; H.Sax
- ☐ Infections nosocomiales en pratique ambulatoire: Swiss-noso; Volume 6, N°4, Décembre 1999; N. Troillet, Sion et A. Widmer, Bâle

☐ Ressources :

Infirmières/iers spécialistes en PCI de votre canton / région / institution





MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Des questions ?