


NOROVIRUS: gestion de l'épidémie

- Identifier en premier lieu l'épidémie
- Prélèvements d'échantillons
- Prendre des mesures immédiates
 - Circonscrire la poussée épidémique
 - » Hygiène des mains soignée et systématique
 - » Nettoyage et désinfection des surfaces et du linge
 - » Mesures concernant les denrées alimentaires si suspicion
 - Protéger les personnes saines qui sont exposées
- Communiquer
 - Au sein de l'établissement
 - Médecin cantonal
 - Cellule HPCI



NOROVIRUS: mesures à prendre

- Désinfection des mains
- Désinfection de l'environnement
- Matériel
- Traitement du linge
- Protection du personnel
- Isolement de contact
- Déclaration de l'épidémie





Mains

- Désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique à base d'éthanol, efficace contre le NV
 - » Stérillium® Virugard
 - » Skinman® Intensiv
 - » Softa-Man® acute
 - » Desderman® N
 - » ...
- Respect du temps de contact



Environnement

- Surface mobiles et fixes, y compris sanitaires
 - Eau de Javel 2% (à diluer pour atteindre une concentration de 0.5 à 1 %) ou Dismozon[®] (oxygène actif)
- Désinfection biquotidienne
- Les surfaces souillées doivent être nettoyées avant toute désinfection



Eau de Javel (1)

- L'eau de Javel doit être utilisée après nettoyage avec un détergent
- Très volatile :
 - Utilisation immédiate et en pastilles de préférence
- Doit **TOUJOURS** être utilisée seule



Eau de Javel (2)

- Dilution à l'eau froide
- Ne pas utiliser d'alcool après application d'eau de Javel sur la peau
- Porter des gants en caoutchouc
- Stockage à l'abri de la lumière et hors de portée




Matériel

- Le matériel doit être désinfecté après chaque usage :
 - » Manchette à pression
 - » Stéthoscope
 - » Thermomètre
 - » ...
- Les objets susceptibles d'avoir été contaminés doivent être éliminés à la fin de l'épidémie
 - » Rouleau de papier hygiénique
 - » Mouchoirs en papier
 - » ...



Linge



- Le linge sera transporté dans un sac en plastique, imperméable et hermétiquement fermé.
- Il sera lavé en machine à une température > à 60°C.



Mesures concernant les denrées alimentaires

- Si denrées mises en cause
 - » retrait immédiat
 - » informer le contrôle cantonal des denrées alimentaires
- Éviction du personnel souffrant de symptômes gastro-intestinaux
- Pendant une épidémie, il est recommandé de ne pas préparer de repas froids tels que salades, sandwiches, etc.



Protection du personnel

- Formation et information du personnel
- Port de gants et surblouse lors de soins aux résidents infectés
- Port de gants et surblouse lors de nettoyage
- Port d'un masque si vomissements
- Éviction immédiate de tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes



Isolement de contact

- Maintien du résident en chambre
- Cohortage possible
- Masque*, blouse, gants
- Cohortage du personnel si possible
- Maintien de l'isolement de contact 5 jours minimum ou 48h après l'arrêt des symptômes



***Masque : si vomissements**

MERCI de votre attention

Références :

✓Norovirus Brochure : caractéristiques biologiques, épidémiologie, tableau clinique, prévention. Recommandations pour la gestion des épidémies. OFSP nov. 2005 (www.bag.admin.ch)

✓Norovirus : questions et réponses. Bull. OFSP 8.12.2004