



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

Retour d'expérience prise en charge cas de pédiculose à l'hôpital du Valais

Service des Maladies Infectieuses
Institut Central des Hôpitaux
10.03.2025

Plan de présentation

- I. Introduction Hôpital du Valais
- II. Pédi culose et PCI
- III. Spécificités de l'unité de pédopsychiatrie
- IV. Chronologie et historique de la situation
- V. Prise en charge des cas
- VI. Implication de l'équipe PCI
- VII. Enjeux



L'Hôpital du Valais- Les Sites

MONTHEY



ST-MAURICE



SION



SIERRE



MARTIGNY




SION – ICH - DG



VIEGE



BRIGUE



Pédiculose

Risque infestation
patients, personnel
et visiteurs

Impact sur la
réputation de l'unité
, voir de l'hôpital

Coût
supplémentaires

Charge de travail
importante pour les
professionnels

Confiance dans les
soins hospitalier
pour les contacts

Stigmatisation et
bien être
psychologique

*Pediculus humanus
capitis*

libération des larves
après 7 à 10 jours
(température idéale
29°C-32°C)

durée du stade
larvaire de 9 à 12
jours en fonction de
la température



Pédopsychiatrie

- **Activités :**
 - Art thérapie
 - Thérapie cognitivo-comportementale en groupe
 - Jeux de rôle
 - Sorties éducatives récréatives
 - Séance de soutien familial

- **Diagnostic chez les patients concernés :**
 - Dépression

Chronologie et historique de la situation



Site de Sierre :

Service de pédopsychiatrie d'environ une dizaine de lits, avec des chambres seules et doubles.



- **1^{er} cas de pédiculose découvert chez un enfant**



- **2 cas dont une enfant en chambre double**



- **4^{ème} enfant avec des poux, voisine de chambre**




Prise en charge des cas

**Mesures
additionnelles de
contact, si possible
en chambre
individuelle,
jusqu'à 24 heures
après l'application du
traitement topique.**

**Le linge plat et les habits dans les
sacs à linge en plastique, fermés
hermétiquement (double
emballage) et lavés à 60°C.**

**Ce qui ne peut pas être lavé à cette
température, a été déposé dans un
sac plastique hermétique pendant 3
jours et ensuite lavé à température
habituelle.**




**Traitement topique
avec shampoing
Prioderm®.**

**- Les peignes,
brosses à cheveux,
barrettes ont été
trempés dans le
shampoing
pédiculicide.**



Implication PCI



Enjeux généraux

- Communication avec les parents, la direction et l'équipe.
- Un traitement topique adéquat n' a pas pu être garanti chez une patiente car présence des tresses/Rasta.
- Un cas d'échec de traitement (présence de poux vivants après les 2 cycles de traitement) chez une autre patiente: contact avec l'équipe soignante pour identifier des causes d'échec et recommandation de la pharmacie d'un nouveau traitement avec un produit différent.
- Aucun produit de traitement n'est remboursé par l'assurance de base en Suisse.



Et plus encore...

Sentiments de perte de contrôle renforcé par l'hospitalisation

Isolement social mesures additionnelles pouvant exacerber la dépression

Impact sur l'estime de soi chez des patients déjà vulnérables

Perte de confiance dans les soins ce qui peut affecter l'engagement du patient dans le processus de soin

Augmentation de l'Anxiété et stress . Contexte pédo psychiatrie

Stigmatisation et honte car souvent associée au manque d'hygiène pouvant entrainés un jugement négatif de la part des professionnels ou/ et des visiteurs

Conséquences psychologiques



Merci de votre attention!